

## Plumeria – Frangipani

<b>Familie:</b>	Apocynaceae - Hundsgiftgewächse
<b>Herkunft:</b>	tropisches Amerika, Westindische Inseln
<b>Vermehrung:</b>	Samen/Stecklinge/Veredelung
<b>Aussaat Zeit:</b>	ganzjährig
<b>Aussaat Tiefe:</b>	ca. 1 cm schräg ins Substrat stecken + Flügel unbedeckt lassen
<b>Aussaat Substrat:</b>	Kakteenerde, Kokohum oder Anzuchterde + 2/3 Sand oder Perlite 1. im Keimbeutel mit feuchter Küchenrolle > bis Keimung erfolgt
<b>Aussaat Alternative:</b>	2. Samen mit Substrat im Keimbeutel vermischen und an einem warmen Platz legen, dabei täglich den Beutel wenden
<b>Aussaat Temperatur:</b>	ca. 22-25 °C
<b>Aussaat Standort:</b>	hell + konstant leicht feucht halten, nicht naß
<b>Keimzeit:</b>	ca. 1-3 Wochen
<b>Gießen:</b>	in der Wachstumsperiode reichlich wässern + zwischen den Wassergaben immer etwas antrocknen lassen
<b>Düngen:</b>	wöchentlich 0,2%igen phosphatbetonten Dünger oder Langzeitdünger verwenden
<b>Schädlinge:</b>	Spinnmilben > besonders unter Glas
<b>Substrat:</b>	Kakteen- oder Einheitserde + 2/3 Sand oder Perlite
<b>Jungpflanzen:</b>	hell bei mind. 15°C und nur soviel wässern, daß der Wurzelballen nicht völlig austrocknet.

**Überwinterung:** Der Laubfall erfolgt etwa ab Oktober, dies ist auch von Kultivar zu Kultivar recht unterschiedlich. Wenn die Pflanzen ins Winterquartier geräumt werden, sollte das Substrat gut abgetrocknet sein, denn zuviel Nässe über einen längeren Zeitraum läßt die Pflanzen faulen und die Stämme knicken um. Halten Sie die Pflanzen im Winter (in dieser Zeit laublos) hell bei ca. 15°C und so trocken wie möglich, d.h. es wird nur sporadisch, in kleinen Mengen und größeren Abständen gewässert, aber die Wurzeln der Plumerien niemals völlig austrocknen lassen. Verwenden Sie keine großen Töpfe, denn je mehr Substrat enthalten ist, desto länger bleibt die Erde nass. Erst wenn der Neuaustrieb erfolgt und sich die ersten Blätter entwickeln, können die Wassergaben **langsam** wieder gesteigert werden. Je nach Verlauf des Frühjahrs und Beschaffenheit des Standortes z.B. Wintergarten, kann dies evtl. schon im März sein.

**Anmerkung:** Für die Blütenbildung ist es wichtig, daß eine absolute Ruhezeit von November bis etwa Ende April eingehalten wird. Plumerien mögen keine allzu großen Töpfe und sollten auch nur alle 2-5 Jahre umgetopft werden. Bei Sämlingspflanzen ist Blütenfarbe und Form nicht immer identisch, wie die der Mutterpflanzen. Es ist durchaus möglich, dass die neuen Blüten ein etwas anderes Farbspektrum aufweisen, was evtl. zu neuen Züchtungen inspiriert!